

Calendrier vaccinal 2008 en Polynésie française

Arrêté n°1144/CM du 28/08/1998 modifié
(Dernière modification par arrêté n°1/CM du 04/01/2006)

| Age | Vaccins | Observations | Spécialité disponible |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Naissance | BCG | La vaccination BCG à la naissance est la vaccination unique au cours de la vie. Aucune épreuve tuberculinique de contrôle n'est recommandée. | BCG ® |
| | Hépatite B <i>1^{ère} injection</i> | | GENHEVAC B ® |
| 1 mois | Hépatite B <i>2^{ème} injection</i> | | GENHEVAC B ® |
| 2 mois | Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Polio, <i>Haemophilus influenzae b</i> (vaccin combiné DTCPHib) <i>1^{ère} injection</i> | | PENTAVAC ® |
| | Vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent <i>1^{ère} injection</i> | | PREVENAR ® |
| 3 mois | DTCPHib <i>2^{ème} injection</i> | | PENTAVAC ® |
| | Vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent <i>2^{ème} injection</i> | | PREVENAR ® |
| 4 mois | DTCPHib <i>3^{ème} injection</i> | | PENTAVAC ® |
| | Vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent <i>3^{ème} injection</i> | | PREVENAR ® |
| 6 mois | Hépatite B <i>3^{ème} injection</i> | | GENHEVAC B ® |
| 12 mois | Rougeole, Oreillons, Rubéole | 1 ^{ère} vaccination | ROR ® |
| | Vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent <i>Rappel</i> | | PREVENAR ® |
| 16 mois | DTCPHib <i>Rappel</i> | | PENTAVAC ® |
| 24 mois | Rougeole, Oreillons, Rubéole <i>2^{ème} vaccination</i> | La vaccination ROR doit être administrée chez les enfants non vaccinés ou n'ayant reçu qu'une seule dose. | ROR ® |
| 6 ans | Diphtérie, Tétanos, Polio <i>2^{ème} rappel</i> | | REVAXIS ® |
| 11 ans | Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche <i>3^{ème} rappel</i> <i>Rappel</i> | Le rappel tardif contre la coqueluche est administré en même temps que le 3 ^{ème} rappel DTP avec le vaccin coquelucheux acellulaire. | TETRAVAC ® |
| | Hépatite B <i>Primo-vaccination (chez les enfants non vaccinés)</i> | Uniquement chez les enfants non antérieurement vaccinés : schéma complet en 3 doses (2 injections à 1 mois d'intervalle, la troisième 6 mois après la première). Le rappel à 10 ans n'est plus nécessaire. | GENHEVAC B ® |
| 16 ans | Diphtérie, Tétanos, Polio <i>4^{ème} rappel</i> | | REVAXIS ® |
| Adultes | Tétanos, Polio, Coqueluche <i>Rappel</i> | Un rappel tétanos-polio est recommandé tous les 10 ans. Un rappel coqueluche pour les professionnels des garderies et crèches et les professionnels de santé en contact avec les jeunes enfants est recommandé. | TP ® ou REPEVAX ® |
| | Rubéole (<i>pour les jeunes femmes non vaccinées</i>) | Pour les jeunes femmes non vaccinées, la vaccination contre la rubéole est recommandée, par exemple lors d'une visite de contraception ou pré-nuptiale. Il est nécessaire de s'assurer de l'absence d'une grossesse débutante et d'éviter toute grossesse dans les 2 mois suivant la vaccination. | RUDIVAX ® |
| | Grippe | Tous les ans. Gratuité pour les personnes à risque (de plus de 60 ans, de plus de 6 mois en affections de longue durée (ALD), et personnels de santé. | FLUARIX ® ou VAXIGRIP ® |
| | Leptospirose | Professionnels à risque. 1 ^{ère} injection//2 ^{ème} injection entre le 15 ^{ème} jour et le 30 ^{ème} jour//3 ^{ème} injection entre le 4 ^{ème} mois et le 6 ^{ème} mois//Rappel tous les 2 ans. | SPIROLEPT ® |
| Sujets à risque de plus de 2 ans | Infections invasives à pneumocoque | 1 ^{ère} injection de vaccin polysidique 23 valent tous les 5 ans. <i>Pour les enfants à risque de 24 à 59 mois d'âge, la vaccination pneumococcique est recommandée selon le schéma suivant : 2 doses de vaccin conjugué heptavalent à 2 mois d'intervalle suivies d'une dose de vaccin polysidique 23 valent au moins 2 mois après la 2^{ème} dose de vaccin conjugué.</i> Indications : insuffisances respiratoire et cardiaque, antécédents d'infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque, splénectomie, drépanocytose homozygote, syndrome néphrotique, terrain alcoolotabagique avec hépatopathie chronique. | PNEUMO 23 ® |